FFR sans guide FFR-CT et QFR

DR ROMAIN DIDIER, MD, PHD

La FFR est considérée comme le **gold standard** pour déterminer la répercussion physiologique d'une sténose coronaire

FFR-CT

FFR-CT

FFR-CT

CTA

FFR-CT

Etude PROMISE, 10 000 patients symptomatiques ne retrouve pas de différence à 2 ans sur les événements majeurs par rapport aux tests ischémiques standard (Décès, infarctus, complications procédurales)

Réduit Le nombre d'indication de coronarographie 28%

Réduit Le nombre d'indication de coronarographie blanches 44%

Non disponible actuellement en France

Douglas et al NEJM 2015;372:1291-1300

Lu M et al JACC Cardiovascular imaging 2017;10:1350-1358

Quantitative Flow Ratio

Quantitative Flow Ratio ?

Reconstruction 3D des images
angiographiques

Flux TIMI
Comptage de flux

Pourquoi utiliser la QFR en pratique quotidienne?

Etudes de la QFR

14,000+
Patients ¹

17,000+
Lesions ¹

Etude QFR Timeline

1, Medis Internal Summary: QFR publications 2021111 (Internal Document), Medis B.V, Dated: 19 December 2020.

2, Tu, Shengxian, et al. "Diagnostic accuracy of fast computational approaches to derive fractional flow reserve from diagnostic coronary angiography: the international multicenter FAVOR pilot study." JACC: cardiovascular interventions 9.19 (2016): 2024-2035.

3, Westra, Jelmer, et al. "Diagnostic performance of in-procedure angiography-derived quantitative flow reserve compared to pressure-derived fractional flow reserve: the FAVOR II Europe-Japan study." Journal of the American Heart Association 7.14 (2018): e009603.

4, Xu, Bo, et al. "Angiography-based quantitative flow ratio for online assessment of coronary stenosis: FAVOR II China study." Journal of the American College of Cardiology (2017): 24376.

Etudes de la QFR

FAVOR III

Primary Endpoint (ITT)

No. at risk	0	2	4	6	8	10	12
QFR-guided	1913	1845	1840	1828	1821	1809	1795
Angiography-guided	1912	1804	1798	1783	1770	1762	1732

Ref Frt

0% de 2 Gy
mGy/min 4.6
73BPM
15 cm
102 cm
↓17 cm

L 0 deg
RAO 14 deg
CRA 21 deg

RECORDING SYSTEM
AO
92/51/70
00:00
800 ms
75 bpm
M.L
60.0 1.51 54.0 kg 73 95 118/59/85

Limites de la QFR

Limitations

Bonnes pratiques

Bonnes pratiques

Plus la qualité de l'image est meilleure, Plus la mesure de la QFR est fiable

Bonnes pratiques

Importance du choix de la seconde incidence

Bonnes pratiques

Importance du choix de la seconde incidence

*Suivre les
recommandations
d'incidences*

ou

Utiliser l'assistant online

Vessel	1st View	2nd View
LAD/Diag	AP, CRA 45	RAO 30, CRA 20
LCX/OM	LAO 10, CAU 25	RAO 25, CAU 25
RCA	LAO 45, CAU 10	LAO 20, CRA 20
LM	RAO 20, CAU 45	AP, CAU 10

Bonnes pratiques

Modifier les contours uniquement si nécessaire

Cas Clinique: QFR et lésions multiples

Mr M 70 ans

Angor d'effort

Pas de lésion significative du réseau gauche

Cas Clinique: QFR et lésions multiples

Cas Clinique: QFR et lésions multiples

Cas Clinique: QFR et lésions multiples

Cas Clinique: QFR et lésions multiples

Cas Clinique: QFR et lésions multiples

Pré

Post 18 mm x 3.5 mm DES

Cas Clinique: QFR et lésions multiples

Messages

FFR-CT

A partir du coroscanner

Permet de mieux sélectionner les patients stables devant avoir une coronarographie

Non disponible actuellement en France

QFR

A partir de l'angiographie

Excellente prédiction de $FFR \leq 0.80$

Avantages: rapidité, rétrospective, pas de guide, prix, angioplastie guidée par la physiologie

Limitations: précautions d'usages